

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 12 numéros par an

EDITION DE LA STATION DU MIDI (Tél. 52.73.20)

(ARIÈGE, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRÉNÉES,
TARN, TARN-ET-GARONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 11, rue de la Plume - TOULOUSE.

C. C. P. : TOULOUSE 8514-19

Supplément n° 3 au Bulletin n° 43

1964-10

ARBRES FRUITIERS

- AVERTISSEMENTS -

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - Une nouvelle sortie de taches qui risque d'être importante est prévue pour les premiers jours du mois de Mai. En outre, les germes hivernants contenus dans les feuilles mortes sont encore nombreux et la végétation s'accroît rapidement depuis quelques jours. En conséquence, il est indispensable de demeurer vigilant et d'appliquer un nouveau traitement soigné dès la première menace de pluie.

VIGNE

BLACK-ROT - Nous rappelons les termes de notre précédent bulletin. Un traitement devrait être mis en place avant les prochaines pluies et le plus près possible de celles-ci.

ARBRES FRUITIERS

- INFORMATIONS -

OIDIUM DU POMMIER - On observe actuellement parfois de nombreuses pousses oïdiées recouvertes de fructifications du champignon. Supprimer dans la mesure du possible ces organes malades et appliquer un des produits conseillés sur l'édition spéciale.

TAVELURE DU PECHER - Dans les vergers où cette maladie s'est manifestée en 1963 (taches noires, arrondies, sur pêches tardives) on pourrait préventivement effectuer dès à présent un traitement en choisissant l'un des produits suivants: T.M.T.D., Captane, Zinèbe ou soufre mouillable.

LYDA DU PECHER - Dans certains vergers (coteaux des régions de Castelnau d'Estretfonds Fronton, Villaudric dans la Hte-Gne, au Nord de Moissac en T-&-Gne, en particulier) de nombreuses pontes ont été déposées et les premières larves sont écloses. Appliquer dès maintenant un insecticide à base de D.D.T., de Parathion ou d'Azinphos. Le traitement est d'autant plus efficace que les larves sont plus jeunes.

CHENILLES DEFOLIATRICES - Différentes espèces de chenilles s'attaquent actuellement au feuillage des arbres fruitiers. En particulier, les hyponomeutes ont repris leur activité et se développent présentement en mineuses. Bientôt, elles tisseront des toiles et seront plus difficiles à combattre. Appliquer un insecticide de contact ou d'ingestion en se conformant à la législation.

HOPLOCAMPE DES POMMES - Les premières larves vont éclore incessamment. Dans les vergers où cet insecte commet des dégâts, traiter dès maintenant mais de toutes façons en dehors de la pleine floraison avec l'un des produits suivants: H.C.H. (120 gr de MA/HL) Lindane (15 gr de MA/HL) Parathion éthyle (20 gr MA/HL) Parathion méthyle (30 gr MA/HL). Bien mouiller et utiliser un appareil à forte pression.

ARAIGNEES ROUGES (*Panonychus Ulmi*) - Les éclosions d'oeufs d'hiver sont très irrégulières selon les lieux. Sur les arbres où des pontes ont été remarquées, observer attentivement la face inférieure des feuilles de la base de la rosette. Si les formes mobiles sont constatées en assez grand nombre, appliquer immédiatement un acaricide.

P. 1. 1. 6

Dans le cas d'arbres encore en pleine floraison, choisir un produit à base soit de Dichlorophenyltrichlorethanol, soit de Thioquinox -non toxiques pour les abeilles-.

VIGNE

MILDIOU - Continuer à supprimer systématiquement les rejets inutiles situés à la base des souches.

OIDIUM - Si le traitement par poudrage, conseillé dans le bulletin précédent n'a pas été encore fait, le mettre en place par journée chaude. Cette application aura également une action contre l'Erinose et l'Acariose.

ARAIGNEES JAUNES ET ROUGES - Les araignées jaunes sont en activité et les éclosions d'araignées rouges sont commencées. Appliquer un acaricide dès maintenant dans les vignes intéressées.

TOULOUSE, le 28 AVRIL 1964

les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

l'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

L. IMBERT